PLATE I

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE

G. GHIBAUDO[1], F. MASSARI[2], I. CHIAMBRETTI[1,3]

1) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino;
2) Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova;
3) ARENA - Trento

CARTA GEOLOGICA DELLA PARTE MERIDIONALE DEL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE

SCALA 1:75.000

0 1 km 2 3

N

Depositi gravitativi di versante indifferenziati. **Olocene – Pleistocene.**

Depositi alluvionali recenti e attuali (**a**) e terrazzati (**b**). **Olocene – Pleistocene.**

ARGILLE AZZURRE (AA)

Marne grigio-azzurre omogenee. **Zanclеano (MP11-MP14a).**

GRUPPO DELLA GESSOSO-SOLFIFERA

CONGLOMERATO DI CASSANO SPINOLA (CS)

Nella località tipo: prevalenti conglomerati a strati spessi (CS_1) intercalati a sedimenti fini (CS_2) con faune salmastre. Nell'area di Acqui Terme: alternanze di livelli arenacei e pelitici con faune dulcicole-salmastre e corpi arenaceo-conglomeratici lenticolari. **Messiniano superiore.**

COMPLESSO CAOTICO DI VALLE VERSA (VV)

Accumulo caotico, localmente entro profonde depressioni erosive, con blocchi di gesso selenitico (Ge), dolomie e calcari dolomitici vacuolari, calcari micritici a Lucina e grandi zolle di Marna di Sant'Agata Fossili e Formazione di Cessole. **Messiniano superiore.**

CONGLOMERATO DI SANT'ALOSIO (SA)

Risedimenti confinati entro profonda depressione erosiva, comprendenti tre corpi lenticolari di conglomerati (SA_1), associati ad arenarie e livelli caotici a blocchi di bioliti e biocalcareniti. Nella parte superiore clasti di calcari metano-derivati (SA_2). **Messiniano superiore.**

MARNA DI S. AGATA FOSSILI (SAF)

Marne emipelagiche omogenee. Laminiti alla base (livello mettico) e nella parte sommitale. **Tortoniano p.p.- Messiniano inferiore (MNN9-MNN11).** Comprende due corpi di risedimenti:

CONGLOMERATO DI VILLA MONTI (VM)

Arenarie e conglomerati in strati spessi (**Stazzano**). L'unità presenta una geometria lenticolare. **Tortoniano p.p.**

CONGLOMERATO DI ORSARA BORMIDA (OB)

Biocalcareniti e biocalciruditi riccamente fossilifere, in strati spessi, articolati in tre corpi minori separati da marne diatomitiche e arenarie spongolitiche, alla base: grossi blocchi di biocalciruditi e intradossi marnosi e diatomitici. **Tortoniano p.p.**

FORMAZIONE DI MALVINO

La formazione è costituita da una massa di fondo costituita da due membri in eteropia laterale.- **Tortoniano p.p.**:

ARENARIA DI MALVINO (Ml)

Arenarie e siltiti bioturbate con gasteropodi, bivalvi, echinoidi, coralli e resti vegetali, con *slump scars* coalescenti al tetto (presso S. Alosio). Passa nell'area di Vargca.

ARENARIA E PELITE DI MASSERIA BOSCHETTO (MBo)

Arenarie torbiditiche fini in strati medi alternate a peliti. Comprendono le corpi canalizzati di conglomerati a matrice arenacea risedimentati, a strati spessi, confinati in un semi-graben delimitato ad E dalla faglia di Vargo.

CONGLOMERATO DI MASSERIA BAIARDO (MBa), CONGLOMERATO DI BOCCA D'ASINO (BA)

contenente rodoliti a locale abbondante macrofauna di piattaforma. **CONGLOMERATO DI VARGO (Vr)**

COMPLESSO CAOTICO DI ROCCA GRIMALDA (RG)

Accumulo gravitativo caotico spesso fino a 150 m, con contatto basale erosivo. Massa di fondo arenaceo-pelitica (RG_1) con clasti di arenarie, calcari micritici a Lucina e grandi olistoliti di Marna di Sant'Agata Fossili e Formazione di Cessole (RG_2) e della Lisborna silicea di Monsasco. A tetto dell'unità olistoliti di maggiori dimensioni. Verso O il complesso comprende una zolla plurichilometrica rovistata, formata da Siltite di Gavi nella parte inferiore (RG_3) e da Arenaria di Serravalle nella parte superiore (RG_4). **Tortoniano inferiore.**

ARENARIA DI SERRAVALLE (Sv)

Base netta marcata da *firm ground* e da areniti bioclastiche grossolane passanti ad areniti ibride da fini a molto grossolane con abbondanti bioclasti (briozoi dominanti), arenarie conglomeratiche, conglomerati e siltiti. In Val Borbera: nella parte inferiore alternanze di gruppi di strati spessi di arenarie conglomeratiche e conglomerati a base erosiva (Costa della Bolla); nella parte superiore strati spessi a base erosiva di arenarie risedimentate in strati spessi (Costa della Bolla). Nell'intervallo (Valle Scrivia) nella parte inferiore sand'waves sia siltitiche (tabora form sets), sia formanti corpi complessi (cosets), alternate a siltiti bioturbate e in associazione con strati arenacei gradati o con laminazione planare o *hummocky*; nella parte superiore prevalenza di cosets. Ad ovest, fino alla valle del T. Orba: nella parte inferiore prevalenti strati spessi di arenarie risedimentate gradate, localmente conglomeratiche, con grossi intradossi pelitici e rare intercalazioni di sand'waves; nella parte superiore prevalenti sand'waves alternate a siltiti bioturbate. **Serravalliano (MNN5b p.p.– MNN7 p.p.).**

FORMAZIONE DI MURAZZANO (Mz)

LINGUA DI BORGOMALE (Mz1)

Lingua della Formazione di Murazzano, con chiusura verso NE entro la Formazione di Cassinasco, formato da marne omogenee bioturbate a stratificazione indistinta con rare intercalazioni di arenarie fini torbiditiche in strati sottili. **Serravalliano (MNN6b–? MNN7 p.p.).**

LITOZONA SILICEA DI MARCHESINI (LS3)

Alternanze ritmiche di siltiti laminate e marne siliciee. **Serravalliano (MNN6b).**

FORMAZIONE DI CASSINASCO (Ca)

Arenarie torbiditiche in corpi tabulari potenti fino ad alcune decine di metri di strati spessi, separati da spessori variabili di alternanze arenaceo-pelitiche in strati sottili. Nella località tipo: prevalenti conglomerati a strati spessi (CS_1) intercalati a sedimenti fini (CS_2) con faune salmastre. Nell'area di Acqui Terme: alternanze di livelli arenacei e pelitici con faune dulcicole-salmastre e corpi arenaceo-conglomeratici lenticolari. **Messiniano superiore.** Km). L'unità presenta rapporti di onlap con il cuneo della Formazione di Cessole e si interdigita con la Lingua di Borgomale. Verso ENE l'unità si suddivide in:
Lingua di Montaldeo (Ca-LM) e **Lingua di Bubbio** (Ca-LB). Tra le valli Bormida e Orba una lente torbiditica (**Arenaria di S. Sebastiano** (Ca-NS), tempo-equivalente della Lingua di Bubbio, è presente nella parte basale dell'unità. **Langhiano inferiore -Tortoniano inferiore (MNN4c).p.p.– MNN5).**

FORMAZIONE DI CESSOLE

Cuneo sedimentario che si assottiglia verso O fino a chiusura presso Vesime. Ad E della Valle Scrivia rapporti basali di onlap e discontanza angolare con le formazioni di Cortemilia, Pratolungo e Rocchetta, e assottigliamento fino a poche decine di metri in prossimità della Linea Sestri-Voltaggio. Comprende due membri in rapporti di eteropia sia verticale che laterale. **Langhiano medio-superiore (MNN 5a p.p.– MNN 5b p.p.).**

SILTITE DI GAVI (Ga)

Ad O della Valle Scrivia, alternanze di siltiti o arenarie fini bioturbate e marne siltose biancastre in strati medi e sottili a stratificazione mal distinta, con echinoidi, pteropodi e spessi bivalvi. Ad E della Valle Scrivia l'unità è discontante sul substrato e presenta un lag trasgressivo basale (Gasolo), discontinuo, a ciottoli e blocchi (fino a 20 m) passanti a siltiti con intercalazioni di strati da medi a spessi di arenarie fini e medie, gradati ed laminati, con abbondanti resti vegetali.

PELITE E ARENARIA DI MORSASCO (Ms)

Alternanze di arenarie torbiditiche fini o siltiti e peliti delicatamente bioturbate. Gli strati di arenaria, 3-30 cm, di colore giallastro, gradati e laminati, e con *climbing ripples* al tetto, contengono minuti bioclasti e abbondanti frustoli vegetali. Le pelliti, spesse 10-30 cm, grigio scure, contengono bivalvi a guscio sottile e pteropodi. Ad O, verso la chiusura del cuneo della Fm di Cessole: intervallo plurimetrico di torbiditi arenacee in strati spessi e medi.

LITOZONA SILICEA DEL T. LEMME (LS2)

Livello guida regionale, esteso dalla Valle Bormida di Millesimo fino alla Valle Scrivia dove è troncato dalla discordanza pre-Langhiana. Massimo spessore in val Lemme con graduale assottigliamento verso O. Nell'area orientale intervalli di 2-6 m formati da siltiti compatenti spesse 5-20 cm in parte silicizzate, con Bathysiphon, otoliti e pteropodi, e intervlari di pelliti bioturbate grige, alternano con intervalli di arenarie fini torbiditiche gradate e laminate con resti vegetali e *Dimpa*. Ad O della Valle Orba l'unità è suddivisa in sotto-unità di spessore decametrico: **Litozona Silicea di Bubbio** (LS2a), estesa fino alla Valle Bormida di Millesimo dove si chiude per erosione, e **Litozona Silicea di Monsasco** (LS2b), suddivisa, ad O dalla Valle Bormida, in due sotto-unità definite **Litozona Silicea di Monastero Bormida** (LS2b1) e **Litozona Silicea di Quartino** (LS2b2), separate da circa 20 m di marne emipelagiche estese fino ai dintorni di Vesime, dove in chiusura. **Burdigaliano sommitale – Langhiano inferiore (MNN 4-p.p.– MNN 5a p.p.).**

FORMAZIONE DI CORTEMILIA (Co)

Alternanze di arenarie torbiditiche e peliti in strati medi e spessi. In Valle Bormida di Millesimo corpi sabbiosi tabulari spessi da qualche metro ad alcune decine di metri, separati da intervalli di spessore variabile di torbiditi arenaceo-pelitiche in strati medi e sottili, passanti verso l'alto ad arenarie in strati spessi e molto spessi, o amalgamati. Nelle Valli Lemme e Scrivia, alternanze regolari di torbiditi bacinali e livelli empelagici. **Burdigaliano medio e superiore (MNN 3b.p.p.– MNN 4a).**

FORMAZIONE DI SEROLE (Se)

Alternanze monotone di arenarie fini torbiditiche con spessore medio di 5-20 cm e peliti. Localmente, nella parte inferiore, alternanze di siltiti torbiditiche con spessore medio di 3-10 cm e peliti. Rare intercalazioni di emipelagiti marnoso-calcaree di spessore decimetrico. **Burdigaliano medio (MNN3a p.p.–MNN3b p.p.).**
La formazione comprende alcuni corpi torbiditici a geometria da tabulare/nastriforme a nettamente lenticolare, formati da alternanze di arenarie e peliti in strati da spessi a molto spessi. Tra questi corpi, quelli più significativi sono: **ARENARIA DI GOTTASECCA** (Gs), **ARENARIA SUPERIORE** (RT2) e **INFERIORE** (RT1) **DEL RIO DELLA TORRE, ARENARIA DI C. ZABOCCI** (CZ), **ARENARIA DI BRIC TORRIONE** (BT), **ARENARIA DI PIANTIVELLO** (Pt), **ARENARIA DI VIGNAZZE** (Ve).

FORMAZIONE DI PRATOLUNGO (Pl)

Unità cuneiforme estesa dalla Valle Calloria fino alla Valle Scrivia, dove è troncata dalla discordanza pre-Langhiana. Massimo spessore (alcune centinaia di metri) ad E, e rapido assottigliamento, fino a 10-20 m, verso O. È formata in prevalenza da marne e calcari marnosi empelagici bioturbati, interstratificati inferiormente (area tra la valle Caglionca e Cavatore, e tra Lerma e Vignole Borbera) con fini areniti o siltiti glauconitiche risedimentate ricche di foraminiferi planctonici: in associazione locale, dove l'unità è più spessa, subordinate peliti torbiditiche con rare sottile e medie di arenarie fini quarzose. **Burdigaliano medio (MNN3a p.p.– MNN3b p.p.).**
Comprende i seguenti membri:

ARENARIA DI COSTA MONTADA (CM)

Unità lenticolare formato da arenarie fini torbiditiche in strati medi e spessi, amalgamati o con sottili interstrati pelitici. **Burdigaliano medio (MNN3a p.p.).**

GLAUCONIA DI VISONE (GV)

Biocalcareniti fini ibride e bioturbate a glauconia e glauconeriti fini passanti verso l'alto a siltiti; l'unità è esclusiva dell'area di Acqui Terme-Visone, dove è troncata dalla discordanza pre-Langhiana. Nell'area di Acqui Terme (Località Cimaferle) il contatto è discordante su Arenaria di Serravalle (Sv). **Burdigaliano inferiore (MNN3b p.p.).**

GLAUCONIA DI LERMA (GL)

Unità estesa dalla Valle dell'T. Visone alla Valle dell'T. Borbera dove è troncata dalla discordanza pre-Langhiana. Lucida discordanza angolare alla base. Glauconeriti bioturbate da medio-grossolane a fini; con *firm ground* basale ricoperto da lag con clasti di marne e di rocce del basamento e dentti di ostaci. **Burdigaliano medio (MNN3a p.p.).**

FORMAZIONE DI MONTECHIARO D'ACQUI (MC)

Presente nella Langa, dove il contatto superiore è comprensivo di una discordanza più o meno estesa dalla sovrastante Arenaria di Diano d'Alba (Cattaneo & Gnaccolini, 2005). Nell'area di Acqui Terme il contatto è netto e discordante sulla Glauconia di Lerma, raffiora tra le valli Lemme e Scrivia, ed è troncata dalla discordanza pre-Langhiana più ad E. Marne compatte emipelagiche in strati sottili e medi con rare intercalazioni di siltiti in strati sottili, contenenti corpi lenticolari o cuneiformi di calcareniti/calcirudi e depositi silicoclastici risedimentati. Nella parte sommitale due intervalli di spessore metrico formati da alternanze sottili e medie di calcari marnosi e siltiti competenti a variabile contenuto in silice. Facies empelagiche di scarpata dominanti nelle Langhe sono sostituite da facies emipelagiche prevalentemente sottomarine sull'altopiano del Monferrato. **Aquitaniano sommitale – Burdigaliano medio (MNN2d p.p.– MNN3a p.p.).**
Dei vari membri presenti ripiu significativi sono:

1) unità torbiditiche costituite da alternanze di arenarie e peliti in strati da spessi o molto spessi a sottili: **ARENARIA SUPERIORE DEL RIO DELLA CHIESA** (RC2), con un distinto *flow* spesso fino a 4m nella parte bassa, **ARENARIA DI C. CIAPPELLANO** (CI), **ARENARIA INFERIORE DEL RIO DELLA CHIESA** (RC1). **Burdigaliano inferiore (MNN2b p.p.).**

2) corpi a geometria da lenticolare a cuneiforme formati da arenarie e conglomerati risedimentati associati ad una significativa componente bioclastica (rodoliti, bivalvi, echinoidi, briozoi, macroforaminiferi) e localmente a peracoroglmerati, livelli caotici, olistoliti e slumps: **ARENARIA DEC. MAZZURRE** (Ma) corpo cuneiforme delimitato a NE dalla faglia sinsedimentaria di Pian del Buri, con due livelli carbonatici caotici da frana sottomarina (MaL). **ARENARIA DI CHIAPPINO** (Cp), **ARENARIA DI ROCCA CROVAGLIA** (RC). **Burdigaliano inferiore (MNN2b p.p.).**

3) Unità minori di biocalcareniti e biocalciruditi risedimentate con alghe corallinacee, echinoidi, bivalvi: **CALCARENITE DI C. MEVIE** (Ns) (due strati (Ns1 e Ns2)), **CALCARENITE DI PIAN BRUNO** (Pb), **CALCARENITE** (Pg_1) e **GLAUCARENITE** (Pg_2) **DI C. POGGI**, **CALCARENITE DI CIANAZZO** (Ci), **CALCARENITE DI C. DEL TASSO** (Ts), **CALCARENITE DI RIO CALIOGNA** (Ci). **Burdigaliano inferiore (MNN2c p.p.).**

4) Unità lenticolare formata da arenarie bioturbate di *delta front* con laminazione planare e *hummocky* organizzate in parasequenze *thickening-and-coarsening upwards*: **ARENARIA DI CARROSIO** (Car). **Burdigaliano inferiore (MNN2b p.p.).**

5) Livello di marne siltose empelagiche glauconitiche intensamente bioturbate: **GLAUCONIA DEL RIO DELLA CHIESA** (GRC) - **Aquitaniano sommitale?**

CALCARE DI VISONE (Vi)

Escluso dell'area di Acqui Terme-Visone dove è spesso ~ 22m, verso S, E ed O diminuisce di potenza fino a scomparire. Poggia in discordanza angolare (con ampia lacuna) sulla Fm di Rocchetta ed è formato da biocalcareniti e biocalciruditi riccamente fossilifere (macroforaminiferi, alghe corallinacee, echinoidi, bivalvi, balanidi, briozoi, serpulidi). Una discontinuità erosiva al suo interno separa una sotto-unità inferiore con associazione ad *Operculina* da una sotto-unità superiore con associazione ad *Amphistegina* e *Miogypsina*. **Burdigaliano inferiore (MNN2b).**

LITOZONA SILICEA DI MONTECHIARO D'ACQUI (LS1)

Orizzonte guida esteso regionalmente, salvo tra le valli Calloria e Lemme dove è eliso dalla discontanza alla base del Calcare di Visone e dalla Glauconia di Lerma, a sé NE della Valle Scrivia dove è troncato dalla discordanza pre-Langhiana. Consiste di alternanze di: 1) intervalli di 2-10 m formati da arenarie competenti bioturbate da medie a molto fini, in strati per lo più di 2-6 cm, rosso-brune per alterazione, con base e tetto netti ed erosivi, 2) intervalli di spessore metrico formati da alternanze sottili e medie di calcari marnosi e siltiti competenti a variabile contenuto in silice, 3) intervalli di spessore da 1-2 m a 10 m di fogliettate a composizione/organizzazione con laminazione parallela, e 2) intervalli marnosi omogenei di 2-6 m. L'unità passa lateralmente a marne omogenee alla testata del Rio della Rocchetta (ad ONO di Spigno Monferrato) (LS1d), e presenta un aspetto più calcareo alla testata del Rio Ovrano. Al Molino d'Ovrano, alla base, biocalcareniti glauconitiche risedimentate in strati medi e spessi (LS1c). A S/S-S San Massimo l'unità è suddivisa in: **Litozona Silicea di Bric Baracconi** (LS1a), **Litozona Silicea di C. Ranari** (LS1b) e **Litozona Silicea di Bric Mombarone** (LS1c), separate da marne emipelagiche (Arenaria di Nocelo (LS1a), dalla Formazione di Pogggio (LS1b) e dalla Formazione di Scaletta Uzzone (LS1c). **Aquitaniano (MNN1c – MNN1d p.p.).**

FORMAZIONE DI SCALETTA UZZONE (SU)

Arenarie torbiditiche, arenarie conglomeratiche e ed i conglomerati in strati da spessi ad amalgamati o separati da sottili livelli pelitici. Locali intercalazioni di alternanze di arenarie e peliti in strati spessi e medi. **Aquitaniano medio (MNN1d p.p.).**

FORMAZIONE DI POGGIOLO (Po)

Alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche in strati da spessi a sottili. **Aquitaniano inferiore (MNN1d p.p.).**
La formazione comprende due membri:

ARENARIA DEL RIO PORCAVIO (RP)

Arenarie torbiditiche in strati spessi e amalgamati, localmente associate ad alternanze arenaceo-pelitiche in strati medi e spesse e a rari debriti ibrei e slumps plurimetrici; nella parte superiore, unità minori thinning- and fining-upwards.

ARENARIA DI C. CARLONI (Cr)

Unità blandamente lenticolare di alternanze torbiditiche in strati spessi e molto spessi, medi nella parte sopèriore.

FORMAZIONE DI ROCCHETTA (Ra)

Due depositi-reti principali: regionalmente nelle Langhe, con spessori di oltre 1300 m, e nell'area di Borbera-Grue, con spessori fino a 700 m. Nell'area di Borbera-Grue, in particolare, dove l'unità è spessa poche centinaia di metri. L'unità è troncata a tetto dalla discordanza angolare alla base del Calcare di Visone e della Glauconia di Lerma nell'Alto Monferrato e dalla discordanza angolare pre-Langhiana nell'area Borbera-Grue. In quest'ultima l'unità comprende le formazioni di Monastero (auct.) e di Rigoroso (auct.). L'unità consiste di pelti empelagiche bioturbate dominanti alternate ad arenarie fini e siltiti torbiditiche in strati sottili e medi, e comprende corpi torbiditici arenacei e conglomeratici a base erosiva, lenticolari o cuneiformi, organizzati in parasequenze *thickening-and-coarsening upwards* caratterizzate da un progressivo rapporto largheza/spessore crescente verso l'alto. La formazione nel suo complesso presenta una tendenza *fining upwards*, con la parte superiore formata da marne emipelagiche dominanti, contenenti livelli cineritici particolarmente nell'Alto Monferrato e nell'area Borbera-Grue. Nell'Alto Monferrato orientale e nell'area Borbera-Grue la base dell'unità è rappresentata da uno *slump scar* composito (glyricloheimitico (*slump scar* di Sottovalle) che elida importanti volumi della sottostante Fm di Molare. **Rupeliano medio sommitale-Cattiano (MNP23 p.p.– MNP1 p.p.).**
Dei corpi torbiditici presenti vengono descritti solo quelli di maggiori dimensioni e più significativi.

FORMAZIONE DI MOLARE

ARENARIA DI MOLARE (Mo_1)

Lag trasgressivo basale eterometrico e discontinuo, spesso fino ad alcuni metri, a ciottoli e blocchi da subarrotondati ad arrotondati, localmente incrostati da coralli (Cymbers di Costa a S di Ovada); arenarie da molto grossolane a localmente conglomeratiche a fini specie nella parte sommitale, fossilifere (lamellibranchi, gasteropodi, echinoidi, coralli, briozoi e macroforaminiferi), generalmente bioturbate con intervalli crescente verso l'alto, in strati da medi a spessi ed amalgamati con contatti di base netti ed erosivi, privi di strutture o gradati, o gradati e laminati, con laminazione da planare a *hummocky* e locali clasti intrafromazionali (Mo_{1a}). Depositi di fan-delta *front* più grossolani nelle aree di Montaldo e E di Spigno Monferrato e di Rio Grande (ad ONO di Molare. La parte superiore dell'unità contiene localmente brecciole monogeniche a breccr eterometriche e disorganizzate (Mo_{1b}) con clasti di base locale subarrotondati metricmchio talora dalle dimensioni di grossi olistoliti (area di Ticlello-Cimaferle; loc. Cappelletta a NO di Bandita - Vk). **Rupeliano medio (MNP23 p.p.).**

CALCARE DI PRASCO (Pr)

Livelli metrici discontinui di bioliltiti, biocalcareniti e biocalciruditi ad alghe corallinacee, coralli, lamellibranchi, briozoi, anellidi e macroforaminifer alla sommità dei conglomerati di Molare (Mongiardino) e sul basamento pre-Cenozoico in aree di alto strutturale (T. Visone e Bric Mazzapiede presso Prasco e Degio). **Rupeliano medio?**

CONGLOMERATO DI MOLARE (Mo_2)

Conglomerati poligenici a composizione variabile, a ciottoli e blocchi fino a plurimetrici del substrato pre-Cenozoico, da subangolosi a subarrotondati e mal classati, a matrice arenacea o arenaceo-pelitica, grossolanamente stratificati in strati spessi ed amalgamati o separati da livelli discontinui di arenarie da molto grossolane a medie; interstratificati a brecce nella parte inferiore. Presenza fin dalla base di clasti di rocce cretaciche ed eoceniche non più affioranti nelle aree adiacenti. Conglomerati a supporto di matrice arenacea, in strati da spessi a molto spessi mediamente in aumento verso NE da circa 60 m fino a più di 1000 m. Da O verso E cambia significativamente la facies; nei gradoni di Borgo, Carbosio e Albareto: conglomerati con matrice arenacea o arenaceo-pelitica rossastra o giallo-bruna e marcanti di intercalazioni marine. Nel gradon di Lerma: corpi clinostratificati tipo Gilbert e almeno due intercalazioni plurimetriche di arenarie marine bioturbate con lag trasgressivi basale grossolano, la superiore delle quali lateralmente persistente (**Unità di San Rocco - SK**): nella parte inferiore olistoliti di dimensioni fino a 100 m di Rocchetta e Molare, nella parte superiore clasti di Calcare di Visone e della Glauconia di Lerma nell'area Borbera-Grue: facies marine fossilifere bioturbate di piattaforma con tempestiti, passanti verso l'alto a conglomerati da flusso gravitativo a stratificazione grossolana con intercalazioni pelitiche. Nel gradoni di Lerma-Sparti: depositi da flusso gravitativi, comprendenti conglomerati e arenarie in strati da medi a molto spessi, un corpo con profonda superficie erosiva basale (Sasso), debriti ibrei e pelitic nella parte inferiore: litozona ad olistoliti e olistostroms (**Litozona di Persi - Ps**) comprendente un olistolite carbonatico di dimensioni ettometriche dell'Unità Antola (Monte Antola, Monte Carmo di Loano) e Unità Ligure Ordinarie e Sub-Ligure; strato-sostenute di spessore decametrico costituite da (i) bancate e subordinati gabbri (cfr. "breccia ophitica" di Eckeren, 1974) - cat E di C. Comaya e (ii) metacalcari e metadolomie. A partire da Cassalegio Bonio verso NE: profonda discordanza erosiva di dimensioni plurichilometriche (*slump scar* di Sottovalle) al contatto con le Fm di Rocchetta. **Rupeliano medio (MNP 23 p.p.).**

BRECCIA DI MONTE ALPE (MA)

Breccie disorganizzate o stratificate in spesse bancate, con clasti di larzoliti e serpentiniti di dimensioni fino a plurimetriche e matrice arenacea o arenaceo-pelitica, e subordinati conglomerati. L'unità forma la parte basale del riempimento del Graben di Borbasca in concordanza con il sopratante Conglomerato di Molare. Altrove la breccia non sono state distinte. **Rupeliano medio.**

CONGLOMERATO DI SAVIGNONE (Sa)

Forma il riempimento del graben (o bacino pull-apart) della Val Borbera e di Voltbia-Savignone con uno spessore di ~ 2000 m. È costituito da conglomerati risedimentati per lo più clasto-sostenuti, in strati spessi e molto spessi; a ciottoli e blocchi prevalentemente di calcareniti e calciluditi dell'Unità Antola, con sviluppo di dinosoldatticuzioni di grande altezza. Nella parte inferiore, in Val Borbera: livelli tnasgressivi con *lag* basali e depositi di sfonefacie; nella parte superiore: locali pelliti ciotolose. **Rupeliano inferiore (MNP22 p.p.).**

FORMAZIONE DI PIANFOLCO

PELITE E ARENARIA DI PIANFOLCO (Pi)

Siltiti, argille, lignli, arenarie e subordinati conglomerati. Molto abbondanti i resti vegetali di Gimnosperme termofile e ignofile indicanti un contesto climatico tropicale o subtropicale oceanico. Nei conglomerati le litologie dei clasti comprendono prevalentemente serpentiniti, calcari e dolomie, largamente subordinate quarciti e gneiss. Presenti anche clasti di rocce cretaciche ed eoceniche non più affioranti nelle aree adiacenti. **Eocene Superiore? Rupeliano inferiore?**

BRECCIA DI COSTA DI CRAVARA (CC)

Brecce eterometriche associate nella parte alta a percentuali minori di conglomerati a clasti arrotondati, spesse ~ 60-80 m, da caotiche a scarsamente stratificate, a supporto di clasti o di matrice; la composizione riflette il locale substrato metamorfico. **Eocene Superiore? Rupeliano inferiore?**

BASAMENTI PRE-CENOZOICI ALPINO E APPENNINICO INDIFFERENZIATI (BAL, BAP)

Il basamento pre-Cenozoico è formato da unità Alpine e Appenniniche affioranti rispettivamente ad O e ad E della Linea Sestri Voltaggio; è stato indicato con un solo colore, con l'unica differenziazione dell'uso della sigla **BAL** per le unità Alpine della Zona Piemontese e le unità oceaniche del Gruppo di Voltri, e la sigla **BAP** per le unità Liguridi.

Faglia
Faglia trascorrente
Sinclinale
Giacitura degli strati
Slump scar semplice e composito
Discordanza pre-Langhiana
Presunta traccia di faglia sepolta
Thrust
Anticlinale
Strati Orizzontali
Superficie presunta di distacco gravitativo con indicazione del senso di movimento
Paleocorrenti

SUCCESSIONI EPILIGURI NON CARTOGRAFATE

LAVORO ESEGUITO CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI: M.U.R.S.T. Fondi 60% 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e Fondi 40% 1995. GHIBAUDO (TORINO): C.N.R. – CENTRO STUDI PER L'OROGENO DELLE ALPI ORIENTALI e M.U.R.S.T. – FONDI 60% 1999, 2000; MASSARI (PADOVA): FONDI 60% 2004, 2005, 2006; CLARI (TORINO);

Base topografiche: A) Carta Tecnica Regionale della Regione Piemonte (Settore Cartografico) con l'autorizzazione in base all'art. 1, com. 3 del Disciplinare approvato con DGR n. 75-34767 del 23-01-1990. Controllata e semi-della legge n° 68 del 2/2/1960. Nulla Osta alla diffusione n°. 8 del 04/05/2001;
B) Carta Tecnica Regionale della Regione Liguria (Servizio Sistemi Informativi) con autorizzazione n°7201 del 03/07/2001.
Stampa: La Grafica Faggian s.r.l. - Camposampiero (PD); Elaborazione grafica, informatizzazione ed allestimento per la stampa: Dott. Geol. Igor Chiambretti.

NOTE:

La rappresentazione cartografica della geologia delle aree di Borbasca e Borbera-Grue è basata sull'esame di foto aeree e immagini satellitari ad alta risoluzione e su dati ottenuti tramite escursioni speditive. Pertanto in queste aree la rappresentazione della faglia e dei limiti litostratigrafici può essere imprecisa.

La faglia del basamento che non dislocano la copertura sedimentaria non sono state cartografate.